Варикоцеле яичек

В современном мире количество случаев мужского бесплодия приравнивается к женским показателям. Одной из причин бесплодия у мужчин является варикоцеле яичек. Это патология, при которой происходит венозное расширение и нарушение кровообращения в яичках.

Признаки патологии

В начальной стадии своего развития варикоцеле никак не проявляется, не доставляя неудобств и неприятных симптомов. Признаки появляются уже на поздних стадиях в виде тянущих болей, которые возникают в области мошонки и паха. Внешним симптомом являются заметные вены, проявляющиеся уже на третьей стадии. На второй стадии варикоцеле они хорошо слышны на ощупь. Не вовремя вылеченное заболевание может привести к бесплодию у мужчины. Примечательно, что риск развития заболевания больше у подростков, чем у взрослых мужчин.

Лечение варикоцеле

Успешному лечению поддается болезнь только на начальной стадии. В этом случае эффективный результат сможет обеспечить устранение причины, например, варикозного расширения вен. Вот почему лицам мужского пола, начиная с подросткового возраста, нужно регулярно посещать специалиста в целях профилактического осмотра.

Если патология находится на поздней стадии развития, лечение подразумевает проведение оперативного вмешательства. После операции могут проявляться некоторые симптомы, которые считаются нормой. Это:

-

болевые ощущения в пораженной области;

-

отечность места, где осуществлялось хирургическое вмешательство;

-

синяки, появляющиеся в области раны;

-

покраснения;

-

неприятно пахнущие выделения из раны.

Могут иметь место серьезные осложнения, такие как водянка, которая появляется из-за того, что во время операции были затронуты лимфоузлы. Иногда может возникнуть гипертрофия или атрофия яичника, что нарушает процесс выработки и выделения у мужчины спермы. При неудачном оперативном вмешательстве иногда возникает продолжительная сильная боль, обусловленная растяжением придатка яичка. Все эти осложнения возникают редко, но, все-таки, имеют место. Они могут быть совершенно непредвиденными, а могут появляться и по вине специалиста, который неудачно или неаккуратно провел операцию. Поэтому хирургическое вмешательство при [варикоцеле яичек](#)
должен осуществлять специалист высокой квалификации и с немалым опытом в сфере проведения таких операций. А от пациента требуется точное соблюдение всех врачебных рекомендаций до самой операции, а также в послеоперационный период.

Варикоцеле яичек